

## **POSTER I-1**

### **OSTEOMIELITIS DEL CALCANEAL, CAUSA INFRECUENTE DE COJERA EN EL NIÑO PEQUEÑO**

García-Vao Bel C., García-Bermejo García C., Orío Hernández M., Manzano Blanco S., Romero-Hombrebueno N., Cabezas Tapia ME.

Servicio de Pediatría Hospital Universitario del Tajo Aranjuez. Madrid

#### **Antecedentes**

La etiología de la cojera en la infancia es muy variada y hasta un 30% se quedan sin diagnóstico final. Las causas más frecuentes en los niños son los traumatismos y la sinovitis transitoria de cadera.

La osteomielitis es una infección del hueso y de la médula ósea. Los cambios óseos no se localizan en los primeros 7-10 días.

#### **Caso clínico**

Paciente de 2 años que acude por presentar cojera de 9 días de evolución. No enfermedades previas o traumatismos. Exploración física: buen estado general, cojera al, impresiona de dolor en el arco interno al apoyar el pie sobre el talón, no signos de inflamación, no lesiones cutáneas. Tratamiento antiinflamatorio y reposo. Vuelve a los 3 días por persistir los síntomas. Radiografía y analítica normales se cita en consultas traumatología

Acude a los 5 días al no mejorar y en las pruebas de imagen ahora se aprecia lesión lítica en calcáneo derecho

#### **Comentarios**

Las causas más frecuentes de cojera en el niño son traumatismos y sinovitis transitoria de cadera.

En este caso de cojera no se llegó a un diagnóstico certero hasta que se produjeron los cambios radiográficos al ser la analítica de sangre normal.