

PIOJOS

Las hembras ponen 8-10 huevos diarios. Los huevos se llaman liendres. Su localización más frecuente es en la parte posterior de la cabeza y detrás de las orejas. Se abren a los 7-8 días y salen los piojos. No sobreviven más de una semana fuera del cuero cabelludo.

TRANSMISIÓN

Se transmiten de persona a persona por contacto directo con el cabello o al compartir objetos de uso personal (peines, prendas de vestir, ropa de cama...).

DEFINICIÓN

Son insectos que no tienen alas por lo que no saltan ni vuelan, solo corren. No son un signo de falta de higiene ni transmiten enfermedad.

PREVENCIÓN

Cortar el pelo muy corto no cura ni previene la infestación. Las lociones tampoco los previenen. Lo mejor es mirar, una vez detectado algún caso, todos los días el pelo.

QUÉ TENEMOS QUE HACER

Avisar al cole en cuanto detectemos piojos en nuestro hijo. Comprar en la farmacia el tratamiento adecuado y repetir en 7-10 días.

Meter toda la ropa y objetos personales de uso para el cabello en una bolsa cerrada 10 días (los piojos no sobreviven más de 7-10 días fuera del cuero cabelludo). Al día siguiente de ser tratado puede ir al colegio.

